

Accipitridae

La famiglia più diversificata di rapaci diurni



- Aquila reale (1)
- Poiana (2)
- Astore (3)
- Nibbio (4)
- Sparviere (5)
- Biancone (6)
- Falco pecchiaiolo (7)
- Falco di palude (8)
- Albanella minore (9)

- Aquila chrysaëto*
- Buteo buteo*
- Accipiter gentilis*
- Milvus milvus*
- Accipiter nisus*
- Circaëtus gallicus*
- Pernis apivorus*
- Circus aeruginosus*
- Circus pygargus*




- Capovaccaio (1)
- Grifone (2)
- Gipeto (3)

- Neophron percnopterus*
- Gyps fulvus*
- Gypaetus barbatus*









Pandionidae Una sola specie di rapace diurno falco pescatore (1) *Pandion haliaetus*




Falconidae I classici rapaci diurni e falconi da caccia

A Falco pellegrino *Falco peregrinus*
 B Lanario *Falco biarmicus*
 C Gheppio *Falco tinnunculus*

D Grillaio *Falco naumanni*
 E Lodolaio *Falco subbuteo*
 F Falco della regina *Falco eleonorae*








Tytonidae Una sola specie di rapace notturno barbagianni *Tyto alba*



Strigidae I classici rapaci notturni

A Gufo reale *Bubo bubo*
 B Gufo di palude *Asio Flammeus*
 C Allocco *Strix aluco*

D Assiolo *Otus scops*
 E Civetta *Athene noctua*
 F Civetta nana *Glaucidium passerinum*
 G Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Dimorfismo sessuale: le femmine sono più grandi dei maschi ad eccezione che nei rapaci notturni nei quali si osserva il normale dimorfismo sessuale (maschi più grandi delle femmine).

5

Lanidae

Appartengono all'ordine dei passeriformi

Non allevati e non dannosi

predano soprattutto insetti

1 Averla maggiore *Lanius excubitor*

2 Averla cenerina *Lanius minor*

3 Averla piccola *Lanius collurio*

4 Averla capirossa *Lanius senator*



6